

BIJSLUITER

VOORGESTELDE VERSIE (JANUARI 2012)

Vervangt: versie maart 2009
Datum huidige versie: januari 2012

VALDISPERT[®]

45 mg

INFORMATIE

Deze bijsluiter bevat essentiële informatie over Valdispert 45 mg. In deze bijsluiter leest u hoe u dit geneesmiddel het best kunt gebruiken. Ook als u Valdispert 45 mg al eerder heeft gebruikt, is het zinvol de bijsluiter te lezen: er kan nieuwe informatie in staan.

SAMENSTELLING

Valdispert 45 mg bevat 45 mg valerianaextract per dragee. De volgende hulpstoffen zijn verwerkt: lactose monohydraat, Macrogol 4000, microcrystallijne cellulose, watervrije colloïdale siliciumdioxide, magnesiumstearaat, schellak, hypromellose (3 mPas), talk, lichte magnesiumoxide, arabische gom, sucrose, polyvinylpyrrolidon, Macrogol 6000, titaandioxide (E171), natriumcarmellose, bijenwas en carnaubawas.

Valdispert 45 mg heeft kalmerende eigenschappen. Het maakt niet suf.

INHOUD

Valdispert 45 mg is verkrijgbaar in een flacon met 100 dragees.

REGISTRATIEHOUDER

Vemedia Manufacturing B.V., Verrijn Stuartweg 60 – 1112 AX Diemen

Voor meer informatie: bel 0900 233 36 66 (€0,15/min)

Valdispert 45 mg staat in het register van geneesmiddelen ingeschreven onder RVG 02570.

INDICATIE

Bij lichte vormen van nervositeit en spanning. Valdispert 45 mg behoort tot de groep rustgevendende geneesmiddelen.

NIET GEBRUIKEN BIJ

Valdispert 45 mg mag niet worden gebruikt bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen.

WAARSCHUING

Gebruik dit geneesmiddel als u zwanger bent of borstvoeding geeft, alleen na overleg met uw arts.

Voorzover bekend kan Valdispert 45 mg zonder gevaar voor de vrucht overeenkomstig het voorschrift gebruikt worden.

Valdispert 45 mg heeft, voor zover bekend, geen invloed op het rijgedrag of op het bedienen van machines.

DOSERING

Naar behoefte drie maal daags 1–3 dragees met water innemen.

Dragees in het geheel doorslikken.

Neem contact op met uw arts als u dit geneesmiddel langer dan 14 dagen wilt gebruiken.

In het geval van een éénmalige overdosering zijn er geen overdoseringsverschijnselen bekend.

Indien een keer vergeten wordt Valdispert 45 mg in te nemen, wacht dan tot de volgende dosis genomen zal worden. Neem dan niet meer dan de gewone hoeveelheid in.

Vervangt: versie maart 2009

Datum huidige versie: januari 2012

BIJWERKINGEN

Een geneesmiddel heeft soms ongewenste effecten, zogenaamde bijwerkingen. Van Valdispert 45 mg zijn nog nooit bijwerkingen bewezen. Indien u vermoedt dat er toch bijwerkingen optreden, waarschuw dan uw arts.

BEWAREN

Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren. Op de verpakking staat de uiterste gebruiksdatum. Valdispert 45 mg niet bewaren boven de 25 °C.

De bijsluiter is voor het laatst herzien in: januari 2012.